

Cancer de la prostate (C61)

2013

> Données essentielles

300

NOUVEAUX CAS DE
CANCER DE LA PROSTATE

43

DÉCÈS PAR CANCER
DE LA PROSTATE


> Tumeurs invasives de la prostate		Homme
Population (n)		271 765
Incidence (Nombre de nouveaux cas par an)		300
Taux brut (100 000 personnes/ an)		110,4
Taux standardisé (Europe 2013) (100 000 personnes/ an)		160,4
Risque cumulé avant 65 ans (nb. de personnes)		1 sur 34
Risque cumulé avant 75 ans (nb. de personnes)		1 sur 11
Rang ¹		1
Mortalité (Nombre de décès par an)		43
Taux brut (100 000 personnes/ an)		15,8
Taux standardisé (Europe 2013) (100 000 personnes/ an)		28,5
Risque cumulé avant 65 ans (nb. de personne)		1 sur 731
Risque cumulé avant 75 ans (nb. de personne)		1 sur 127
Rang ²		3

¹Rang parmi les nouveaux cas de cancer des principales localisations de tumeurs solides invasives (cancers non mélanome de la peau exclus)

²Rang parmi les causes de décès par cancer des principales localisations de tumeurs solides invasives (cancers non mélanome de la peau exclus)

Sources: Incidence: RNC / Mortalité: Statistique des causes de décès

> Taux d'incidence et taux de mortalité spécifiques par classe d'âge



Sources: Incidence: RNC / Mortalité: Statistique des causes de décès

> Distribution du risque pronostique de récurrence pour les cancers de la prostate localisés ou localement avancés (European Association of Urology)


Risque pronostique de récurrence	Définition	n	%
Cancer localisé à :			
Risque faible	PSA < 10ng/mL et GS < 7 et cT1-2a	39	15,6
Risque intermédiaire	PSA = 10-20ng/mL ou GS = 7 ou cT2b	64	25,6
Risque élevé	PSA >20ng/mL ou GS > 7 ou cT2c	80	32,0
Cancer localement avancé à :			
Risque élevé	Tous PSA, tous GS, et cT3-4 ou cN+	8	3,2
Risque Inconnu	Valeurs PSA, GS, cT ou cN manquantes ; Renseignement insuffisants pour classer la tumeur (cTx) ou l'envahissement ganglionnaire (cNx)	59	23,6
Total*		250	100

*Exclusion : 10 Death Certificate Only, 3 cas sans signe de tumeur primitive (cT0), 37 métastatiques (M1)

PSA : Prostate-specific antigen ; GS : Gleason score ; cT et cN : Classification TNM 7^{ème} édition

Source: RNC

> Distribution des nouveaux cas de cancer de la prostate par classe d'âge




IQR: Interquartile range

Source: RNC

Age médian: 70 ans (IQR 63 - 75 ans)

> Distribution du stade d'extension au moment du diagnostic (TNM 7^{ème} édition) des cancers invasifs de la prostate, par classe d'âge



Source: RNC