

Cancer de la prostate (C61)

2019

> Données essentielles

526

NOUVEAUX CAS DE
CANCER DE LA PROSTATE

55

DÉCÈS PAR CANCER
DE LA PROSTATE


> Tumeurs invasives de la prostate	Homme
Population (n)	311 842
Incidence (Nombre de nouveaux cas par an)	526
Taux brut (100 000 personnes/ an)	168,7
Taux standardisé (Europe 2013) (100 000 personnes/ an)	233,4
Risque cumulé avant 65 ans (nb.de personnes)	1 sur 27
Risque cumulé avant 75 ans (nb.de personnes)	1 sur 8
Rang ¹	1
Mortalité (Nombre de décès par an)	55
Taux brut (100 000 personnes/ an)	17,6
Taux standardisé (Europe 2013) (100 000 personnes/ an)	29,6
Risque cumulé avant 65 ans (nb.de personnes)	1 sur 1231
Risque cumulé avant 75 ans (nb.de personnes)	1 sur 290
Rang ²	3

¹Rang parmi les nouveaux cas de cancer des principales localisations de tumeurs solides invasives (cancers non mélanome de la peau exclus)

²Rang parmi les causes de décès par cancer des principales localisations de tumeurs solides invasives (cancers non mélanome de la peau exclus)

Sources: Incidence: RNC / Mortalité: Statistique des causes de décès

> Taux d'incidence et taux de mortalité spécifiques par classe d'âge



Sources: Incidence: RNC / Mortalité: Statistique des causes de décès

> Distribution du risque pronostique de récurrence pour les cancers de la prostate localisés ou localement avancés (European Association of Urology)


Risque pronostique de récurrence	Définition	n	%
Cancer localisé à :			
Risque faible	PSA < 10ng/mL et GS < 7 et cT1-2a	91	19,7
Risque intermédiaire	PSA = 10-20ng/mL ou GS = 7 ou cT2b	72	15,6
Risque élevé	PSA > 20ng/mL ou GS > 7 ou cT2c	188	40,7
Cancer localement avancé à :			
Risque élevé	Tous PSA, tous GS, et cT3-4 ou cN+	46	10,0
Risque Inconnu	Valeurs PSA, GS, cT ou cN manquantes; Renseignements insuffisants pour classer la tumeur (cTx) ou l'envahissement ganglionnaire (cNx)	65	14,0
Total*		462	100

*Exclusion : 22 Death Certificate Only, 6 cas sans signe de tumeur primitive (cT0), 36 métastatiques (M1)

PSA: Prostate-specific antigen; GS: Gleason score; cT et cN: Classification TNM 8ème édition

Source: RNC

> Distribution des nouveaux cas de cancer de la prostate par classe d'âge




IQR: Interquartile range

Source: RNC

Age médian: 70 ans (IQR 64 - 77 ans)

> Distribution du stade d'extension au moment du diagnostic (TNM 8ème édition) des cancers invasifs de la prostate, par classe d'âge



Source: RNC